IAEA

*PET/CT en
oncología
pediátrica:
Indicaciones
apropiadas*

- ▶ Conocer los aspectos técnicos del PET-CT en Oncología Pediátrica
- ▶ Revisar las principales indicaciones del PET-CT en Pediatría
- ▶ Interpretación de las imágenes del PET-CT en Pediatría
 - ▶ Imágenes variantes de normalidad
 - ▶ Casos clínicos con los tumores más frecuentes en Pediatría
- ▶ Elaboración de informes de PET-CT en Pediatría

1. Aspectos técnicos del PET-CT en Oncología Pediátrica
2. Principales indicaciones del PET-CT en Pediatría e interpretación de las imágenes
 - Imágenes variantes de normalidad
 - Casos clínicos con los tumores más frecuentes en Pediatría
3. Elaboración de informes de PET-CT en Pediatría

1. Aspectos técnicos del PET-CT en Oncología Pediátrica
2. Principales indicaciones del PET-CT en Pediatría e interpretación de las imágenes
 - Imágenes variantes de normalidad
 - Casos clínicos con los tumores más frecuentes en Pediatría
3. Elaboración de informes de PET-CT en Pediatría

REVISIÓN DE LAS GUÍAS CLÍNICAS Y BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

[Contact](#) [Imprint](#) [Data Privacy](#)

[About](#)

[Membership](#)

[Congresses](#)

[Education](#)

[Publications](#)

[Public & Press](#)

[eLearning](#) →

[myEANM-Area](#) →

[Home](#) // [Publications](#) // [Guidelines](#) // [Paediatric](#)

GUIDELINES

→ Guidelines

- [Nomenclature](#)
- [Cardiovascular](#)
- [Central nervous system](#)
- [Musculoskeletal system](#)
- [Respiratory system](#)
- [Gastro-intestinal system](#)
- [Nephro-urinary system](#)
- [Endocrine system](#)
- [Oncology](#)
- [Inflammation/Infection](#)

→ Paediatric

- [Therapy](#)
- [Dosimetry](#)
- [Physics, instrumentation & data analysis](#)
- [Radiopharmacy](#)
- [Preclinical and translational nuclear medicine](#)
- › [Archived Guidelines](#)
- › [Internal Dosimetry Task Force Report](#)

Paediatric

[SNMMI Procedure Standard/EANM Practice Guideline on Pediatric 18F-FDG PET/CT for Oncology 1.0 \(2020\)](#)

[Guidelines on nuclear medicine imaging in neuroblastoma \(2018\)](#)

[The SNMMI and EANM Procedural Guidelines for Diuresis Renography in Infants and Children \(2018\)*](#)

[The SNMMI and EANM Procedural Guidelines for Meckel Diverticulum Scintigraphy \(2014\)](#)

[Paediatric Radiopharmaceutical Administration: Harmonization of the 2007 EANM Pediatric Dosage Card \(version 1.5.2008\) and the 2010 North America Consensus guidelines \(2014\)](#)

[Guidelines for Bone Scintigraphy in Children \(2010\)](#)

[Guidelines on ^{99m}Tc-DMSA Scintigraphy in Children \(2009\)](#)

[Guidelines for Lung Scintigraphy in Children \(2007\)](#)

[Guidelines for Direct Radionuclide Cystography in Children \(2002\)](#)

[Guidelines for Glomerular Filtration Rate Determination in Children \(2000\)](#)

[Guidelines for Indirect Radionuclide Cystography in Children \(2000\)](#)

SNMMI Procedure Standard/EANM Practice Guideline on Pediatric ^{18}F -FDG PET/CT for Oncology 1.0

Reza Vali, Adam Alessio, Rene Balza, Lise Borgwardt, Zvi Bar-Sever, Michael Czachowski, Nina Jehanno, Lars Kurch, Neeta Pandit-Taskar, Marguerite Parisi, Arnaldo Piccardo, Victor Seghers, Barry L. Shulkin, Pietro Zucchetto and Ruth Lim

Journal of Nuclear Medicine January 2021, 62 (1) 99-110; DOI: <https://doi.org/10.2967/jnumed.120.254110>

PETICION - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

DEBERÍA INCLUIR:

- Indicación clínica del estudio
- Resultados histopatológicos si están disponibles
- Información de estudios previos relevantes
- Intervenciones quirúrgicas y biopsias previas
- Quimio y Radioterapia previa
- Historia de infecciones y/o inflamaciones recientes
- Medicación: corticoides, factores de estimulación de las colonias granulocíticas
- Administración reciente de bario por vía oral o rectal
- Necesidad de sedación o anestesia
- Si se precisa CT diagnóstico con o sin contraste
- Antecedentes de reacción a contrastes yodados

PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

EXTENSIÓN DE LA DETECCIÓN:

- Personalizado para cada paciente o patología
- Debe minimizarse la dosimetría
- Tipo de tumor
- Sospecha de extensión de la enfermedad

LINFOMA:

- Diagnóstico: cráneo a pies incluidos
- Seguimiento: Base de cráneo a medio muslo
- Si afectación medular/ósea incluir extremidades
- Si afectación neurológica incluir cerebro

SARCOMA – NEUROBLASTOMA – TUMOR SNC – HCL:

- Cráneo completo a pies

PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

Min: 1.0 SUV
Max: 13.8 SUV
Mean: 4.0 SUV
StdDev: 2.9 SUV

LINFOMA:

- **Diagnóstico: cráneo a pies incluidos**
- Seguimiento: Base de cráneo a medio muslo
- Si afectación medular/ósea incluir extremidades
- Si afectación neurológica incluir cerebro

PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

Min: 1.0 SUV
Max: 13.8 SUV
Mean: 4.0 SUV
StdDev: 2.9 SUV

Min: 0.6 SUV
Max: 13.2 SUV
Mean: 2.2 SUV
StdDev: 2.6 SUV

Min: 0.2 SUV
Max: 6.5 SUV
Mean: 1.3 SUV
StdDev: 1.3 SUV

LINFOMA:

- **Diagnóstico: cráneo a pies incluidos**
- Seguimiento: Base de cráneo a medio muslo
- Si afectación medular/ósea incluir extremidades
- Si afectación neurológica incluir cerebro

PREPARACIÓN DEL NIÑO - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

- Al niño mayor
 - A los padres o tutores
 - Verbal
 - Escrito
-
- Descartar embarazo en adolescentes

PREPARACIÓN DEL NIÑO - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

AYUNAS:

- 4-6 horas
- Si no anestesia, agua oral o bebida sin azúcar
- NO sueros glucosado ni glucosalino
- Glicemia:
 - Aceptable <200 mg/dL
 - Óptimo < 140 mg/dL

Neuroblastoma

PREPARACIÓN DEL NIÑO - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PREPARACIÓN Y FASE DE CAPTACIÓN DEL RADIOFÁRMACO :

- Silla reclinable o camilla
- Evitar antes y después de la administración:
 - Hablar
 - Jugar
 - Mascar chicle o caramelos
 - Chupete: anotar si se usa (captación músculos cavidad oral)
- Recomendar no ejercicio físico 24 horas antes
- PET cerebral: reposo en habitación tranquila y con media luz, sin ruido

INYECCIÓN:

- Crema anestésica (EMLA)
- Distraer al niño
- Porta-Cath:
 - se puede usar en caso de difícil acceso venoso periférico
 - Administrar la dosis diluida
 - Lavar abundantemente con SSF

PREPARACIÓN DEL NIÑO - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

VEJIGA URINARIA:

- Micción antes de pasar a detección
- Niños pequeños: se puede estimular la micción con
 - Posición vertical
 - Andar
- Cambiar el pañal antes de la detección
- Catéter vesical:
 - No de rutina
 - Para valoración de pelvis menor, si persiste la vejiga llena y no es posible la micción:
 - Furosemida 0,5-1 mg/kg o bien
 - Sonda vesical

PREPARACIÓN DEL NIÑO - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PREPARACIÓN PARA DISMINUIR LA CAPTACIÓN DE GRASA PARDA:

- EVITAR el frío durante los días previos
- Sala de inyección con temperatura > 24°C, desde 15 minutos antes y hasta pasar a detección
- Manta térmica
 - Ideal: manta de aire caliente (unidades post-quirúrgicas)

PREPARACIÓN FARMACOLÓGICA PARA DISMINUIR LA CAPTACIÓN DE GRASA PARDA:

- Propanolol
- Fentanyl EV
- Diacepam oral

Name of medication	Route of administration	Recommended dose	Maximum dose	Time of administration	Comments and precautions
Propranolol (64-67).	Oral	1 mg/kg usually 20-40 mg	40 mg	60-90 min before ¹⁸ F-FDG injection	Recommended for patients older than 10 y
Fentanyl (63,64,66)	Intravenous	1.0 µg/kg for patients less than 25 kg	50 µg	10 min before ¹⁸ F-FDG injection	Should be injected under the supervision and monitoring of a physician or a trained nurse according to the institutional sedation policy
		0.75 µg/kg for patients less than 25 kg			
Diazepam (63,69)	Oral	0.080-0.096 mg/kg	7.5 mg	30-60 min before ¹⁸ F-FDG injection	Especially useful for anxious patients

PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CT – CARACTERÍSTICAS KV, mA, NÚMERO Y GROSOR CORTES:

- mAs
- kVp
- Pitch
- Con / sin contraste EV
- Número de cortes
- Grosor de los cortes

Approximate Technique Ranges for the 3 Common Types of CT Acquisitions of the Chest+Abdomen+Pelvis Region for PET/CT for Different Size Patients

Weight (kg)	Lateral distance (cm)	Average age (y)	CTDIvol (mGy)*		
			CTAC	CTAC+CTL	CTAC+CTL+Dx
2.5–12.2	7–11	<1	0.6–0.8	1.1–1.5	1.9–2.5
8.1–23.8	12–18	1–5	0.7–1.0	1.4–2.0	2.4–3.4
14.7–45.6	19–23	5–10	0.8–1.3	1.6–2.6	2.7–4.3
25.9–78.3	24–28	10–15	1.1–1.7	2.1–3.4	3.5–5.7
40.5–95.7	29–33	>15	1.6–2.6	3.1–5.3	5.2–8.8

PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CT – CARACTERÍSTICAS KV, mA, NÚMERO Y GROSOR CORTES:

- Aplicar criterio ALARA As Low As Reasonably Achievable
- Debe minimizarse la dosimetría
- Dose modulation en bastantes equipos

DIAGNÓSTICO INICIAL:

- CT diagnóstico
- Alta resolución, detalle anatómico
- Con o sin contraste

SEGUIMIENTO:

- CT de baja dosis
- CT baja resolución para corrección atenuación y para localización anatómica

Approximate Technique Ranges for the 3 Common Types of CT Acquisitions of the Chest+Abdomen+Pelvis Region for PET/CT for Different Size Patients

Weight (kg)	Lateral distance (cm)	Average age (y)	CTDIvol (mGy)*		
			CTAC	CTAC+CTL	CTAC+CTL+Dx
2.5–12.2	7–11	<1	0.6–0.8	1.1–1.5	1.9–2.5
8.1–23.8	12–18	1–5	0.7–1.0	1.4–2.0	2.4–3.4
14.7–45.6	19–23	5–10	0.8–1.3	1.6–2.6	2.7–4.3
25.9–78.3	24–28	10–15	1.1–1.7	2.1–3.4	3.5–5.7
40.5–95.7	29–33	>15	1.6–2.6	3.1–5.3	5.2–8.8

PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CT – CARACTERÍSTICAS KV, mA, NÚMERO Y GROSOR CORTES:

- Aplicar criterio ALARA As Low As Reasonably Achievable
- Debe minimizarse la dosimetría
- *Dose modulation* en bastantes equipos

CTAC:

CT para corrección atenuación,
baja dosis

CTAC+CTL:

CT para corrección atenuación
y localización anatómica, baja
dosis

CTAC+CTL+Dx:

CT para corrección atenuación,
localización anatómica y
diagnóstico, alta dosis

Approximate Technique Ranges for the 3 Common Types of CT Acquisitions of the Chest+Abdomen+Pelvis Region for PET/CT for Different Size Patients

Weight (kg)	Lateral distance (cm)	Average age (y)	CTDIvol (mGy)*		
			CTAC	CTAC+CTL	CTAC+CTL+Dx
2.5–12.2	7–11	<1	0.6–0.8	1.1–1.5	1.9–2.5
8.1–23.8	12–18	1–5	0.7–1.0	1.4–2.0	2.4–3.4
14.7–45.6	19–23	5–10	0.8–1.3	1.6–2.6	2.7–4.3
25.9–78.3	24–28	10–15	1.1–1.7	2.1–3.4	3.5–5.7
40.5–95.7	29–33	>15	1.6–2.6	3.1–5.3	5.2–8.8

PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CTAC:

CT para corrección atenuación,
baja dosis

POCA INFORMACIÓN
ANATÓMICA EN EL CT

CTAC+CTL:

CT para corrección atenuación
y localización anatómica, baja
dosis

CT INFORMACIÓN ANATÓMICA

CTAC+CTL+Dx:

CT para corrección atenuación,
localización anatómica y
diagnóstico, alta dosis

CT INFORMACIÓN ANATÓMICA

OPCIONAL:

- CT de tórax complementario para detectar
nódulos pulmonares
- No se usa para CA del PET

- Se puede combinar el CT diagnóstico de un
área determinada (por ejemplo cabeza y
cuello, o abdomen) con CT de baja dosis
en el resto de la detección PET

Approximate Technique Ranges for the 3 Common Types of CT Acquisitions of the Chest+Abdomen+Pelvis Region for PET/CT for Different Size Patients

Weight (kg)	Lateral distance (cm)	Average age (y)	CTDIvol (mGy)*		
			CTAC	CTAC+CTL	CTAC+CTL+Dx
2.5–12.2	7–11	<1	0.6–0.8	1.1–1.5	1.9–2.5
8.1–23.8	12–18	1–5	0.7–1.0	1.4–2.0	2.4–3.4
14.7–45.6	19–23	5–10	0.8–1.3	1.6–2.6	2.7–4.3
25.9–78.3	24–28	10–15	1.1–1.7	2.1–3.4	3.5–5.7
40.5–95.7	29–33	>15	1.6–2.6	3.1–5.3	5.2–8.8

PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN - PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

INTÉRVALO DE TIEMPO ENTRE QUIMIO o RADIOTERAPIA Y PET DE EVALUACIÓN DE RESPUESTA:

- No hay datos concluyentes
- Algunos autores sugieren
 - 10 días después de Quimioterapia
 - 2-3 meses después de Radioterapia
- Aunque no se cumplan estos plazos, el PET puede ser útil y se debe interpretar con este conocimiento

1. Aspectos técnicos del PET-CT en Oncología Pediátrica
2. Principales indicaciones del PET-CT en Pediatría e interpretación de las imágenes
 - Imágenes variantes de normalidad
 - Casos clínicos con los tumores más frecuentes en Pediatría
3. Elaboración de informes de PET-CT en Pediatría

CANCER PEDIÁTRICO

> 50%

Leucemia
Tumores cerebrales
Linfoma

Neuroblastoma
Sarcomas de partes blandas
Turmo de Wilms
Tumores óseos

Frecuencia

CANCER PEDIÁTRICO

INDICACIONES DEL FDG PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

	HODGKIN LYMPHOMA	NON HODGKIN LYMPHOMA
INITIAL STAGING	✓	✓
RESPONSE TO THERAPY	✓	✓
DETECTION OF RESIDUAL DISEASE	✓	✓
RESTAGING	✓	✓
PLANNING OF RADIATION THERAPY	✓	✓
PROGNOSTIC INFORMATION	✓	✓

LINFOMA DE HODGKIN

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Detección enfermedad residual
- Progresión y reestadificación
- Planificación radioterápica
- Información pronóstica

Diagnóstico
Afectación supra e infra diafragmática

LINFOMA DE HODGKIN

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Detección enfermedad residual
- Progresión y reestadificación
- Planificación radioterápica
- Información pronóstica

LINFOMA DE HODGKIN

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Detección enfermedad residual
- Progresión y reestadificación
- Planificación radioterápica
- Información pronóstica

LINFOMA DE HODGKIN estadio IV

LINFOMA DE HODGKIN

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Detección enfermedad residual
- Progresión y reestadificación
- Planificación radioterápica
- Información pronóstica

Respuesta metabólica completa

LINFOMA NO HODGKIN

- **Diagnóstico de extensión**
- Respuesta al tratamiento
- Detección enfermedad residual
- Progresión y reestadificación
- Planificación radioterápica
- Información pronóstica

PET-TC al diagnóstico

Biopsia: LNH

Afectación supra e infradiaphragmática

LINFOMA NO HODGKIN

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Detección enfermedad residual
- Progresión y reestadificación
- Planificación radioterápica
- Información pronóstica

PET-TC valoración precoz respuesta

RC

LINFOMA NO HODGKIN

Linfoma T cutáneo

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Detección enfermedad residual
- Progresión y reestadificación
- Planificación radioterápica
- Información pronóstica

PET-TC

14.10.2014:

Linfoma T cutáneo con afectación ganglionar supra e infradiaphragmática

Inician tratamiento con quimioterapia

BX cutánea y ganglionar

14.10.2014: linfoma fenotipo T Alfa/beta+

LINFOMA NO HODGKIN

Linfoma T cutáneo

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Detección enfermedad residual
- Progresión y reestadificación
- Planificación radioterápica
- Información pronóstica

PET-TC

18.12.2014 valoración precoz

Respuesta metabólica prácticamente completa.

Persiste una mínima actividad metabólica de 2 lesiones cutáneas en la parte anterior muslo derecho e izquierdo.

INDICACIONES DEL FDG PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

	OSTEO SARCOMA	EWING SARCOMA	RHABDOMIO SARCOMA	SOFT-TISSUE SARCOMA
INITIAL STAGING	✓	✓	✓	✓
RESPONSE TO THERAPY	✓	✓	✓	✓
DETECTION OF RESIDUAL DISEASE				
RESTAGING	✓	✓	✓	✓
PLANNING OF RADIATION THERAPY				
PROGNOSTIC INFORMATION	✓	✓	✓	✓
DETECTION OF RELAPSE	✓	✓	✓	✓

Osteosarcoma

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Progresión
- Información pronóstica

Diagnóstico

Osteosarcoma

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Progresión
- Información pronóstica

Diagnóstico

Post quimioterapia
Pre cirugía

Sarcoma de Ewing

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Progresión
- Información pronóstica

Sarcoma de Ewing

- Diagnóstico de extensión
- **Respuesta al tratamiento**
- Progresión
- Información pronóstica

SUVmax 8.3

SUVmax 1.8

Diagnóstico

Post quimioterapia
Pre cirugía

Rabdomiosarcoma embrionario

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- **Progresión**
- Información pronóstica

07/2020

11/2020

Sarcoma de partes blandas

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Progresión
- Información pronóstica

INDICACIONES DEL FDG PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

	NEURO BLASTOMA MIBG NEGATIVE
INITIAL STAGING	✓
RESPONSE TO THERAPY	✓
DETECTION OF RESIDUAL DISEASE	✓
RESTAGING	✓
PREOPERATIVE	✓
PRETHERAPY PROGNOSTIC INFORMATION	✓

NEUROBLASTOMA

- TUMOR MIBG NEG AL DIAGNOSTICO
- SEGUIMIENTO CON FDG

FDG

MIBG

NEUROBLASTOMA

- TUMOR DIFERENCIADO
- MIBG+ FDG-

FDG

MIBG

NEUROBLASTOMA

• INFORMACION DIAGNOSTICA PRE-QUIRURGICA O PRE-TERAPIA

- CONTROL PRE TMO
- MIBG: solo captación Tm retroperitoneal
- FDG: intensa captación en
 - Retroperitoneo
 - Mediastino
 - Vértebras
 - Fémures

INDICACIONES DEL FDG PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

	SNC TUMORS	H&N CANCER NASO PHARYNGE AL CANCER	THYMUS CARCINOMA	LANGERHA NS CELL HISTIO CYTOSIS	POST TRASPLANT LYMPHO PROLIF DISORDER
INITIAL STAGING					
RESPONSE TO THERAPY	✓	✓			
DETECTION OF RESIDUAL DISEASE					
RESTAGING					
PROGNOSTIC INFORMATION	✓	✓			
GRADING	✓	✓			
DIFF VIABLE TM VS RADIONECHROSIS	✓	✓			
NEGATIVE IODINE SCAN WITH RISING THYROGLOBULINE

TUMOR Y METASTASIS SNC

- Respuesta al tratamiento
- Grado tumoral
- Progresión – diferenciación tumor viable vs radionecrosis
- información pronóstica

Ependimoma supratentorial anaplásico
DD recidiva vs radionecrosis
 ^{18}F -DOPA PET

TUMOR Y METASTASIS SNC

- Respuesta al tratamiento
- Grado tumoral
- Progresión – diferenciación tumor viable vs radionecrosis
- información pronóstica

Neuroblastoma con lesión
leptomeningea a nivel T7 por RM,
MIBG negativa
 ^{18}F -DOPA PET

CARCINOMA TÍMICO

- DIAGNOSTICO
- PROGRESION

CARCINOMA TÍMICO

- DIAGNOSTICO
- PROGRESION

04/2019

10/2019

Histiocitosis Células de Langerhans

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Progresión

Histiocitosis Células de Langerhans

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Progresión

3/2013

9/2013

Histiocitosis Células de Langerhans

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento
- Progresión

3/2013

9/2013

INDICACIONES DEL FDG PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

	GERM CELL TUMORS	WILMS TUMOR	THYROID CANCER	NEURO FIBROMATOSIS TYPE 1
INITIAL STAGING	✓			
RESPONSE TO THERAPY				
DETECTION OF RESIDUAL DISEASE	✓			
RESTAGING	✓			
PROGNOSTIC INFORMATION	✓			
GRADING				
DIFF VIABLE TM VS RADIONECHROSIS				
NEG IODINE SCAN WITH RISING THYROGLOBULINE			✓	
SUSPICION MALIGNANT TRANSFORMATION NEUROFIBROMA				✓

Tumor germinal

- Diagnóstico de extensión
- **Respuesta al tratamiento**
- Progresión
- Información

08/2020

10/2020

Cancer Papilar de Tiroides

- aumento de tiroglobulina
- rastreo con yodo negativo $^{123,131}\text{I}$

16 años

Ca papilar de tiroides

Anticuerpos antiTg positivos, en aumento

Tg < 0.2

Eco cervical: adenopatías pequeñas persistentes a nivel paratraqueal derecho bajo

Rastreo ^{123}I junio de 2020 negativo

FDG-PET con Thyrogen: adenopatías hipermetabólicas de moderada actividad en región laterocervicales derechas nivel III, fosa supraclavicular derecha y retrotraqueal derecha alta.

INDICACIONES

TRAZADORES NO FDG PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

	NEURO BLASTOMA	TUMORES NEURO ENDOCRINOS	MEDULO BLASTOMA
DOPA	✓	✓	
DOTA-TOC	✓	✓	✓
¹⁸ F-MFBG	✓	✓

NEUROBLASTOMA

^{18}F -DOPA

- Captación en gránulos cromafines
- Calidad imagen
DOPA > MIBG

3 a, NBL 4 abdominal, NMYC no amplif:

- Diagnóstico: DOPA = MIBG
- Post inducción: DOPA > MIBG
 - Cráneo
 - Huesos largos

Diagnóstico

Post inducción

NEUROBLASTOMA

^{68}F -DOTA

- Diagnóstico extensión
- Valoración tratamiento
 - PRRT Lutathera

- Lesión abdominal y femoral MIBG+ y DOTA+
- Más lesiones con DOTA
- Inmunohistoquímica + para receptores somatostatina subtipo 2

Paciente apto para PRRT

MIBG

^{68}Ga -DOTA

NEUROBLASTOMA

^{68}Ga -DOTA

- Diagnóstico extensión
- Tratamiento
- Valoración tratamiento
 - PRRT Lutathera

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CHEQUEAR

- La calidad de las imágenes
- Los factores que pueden influir en el cálculo del SUVmax
 - Dosis administrada
 - Peso y altura del niño

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Anotar cualquier foco captante con actividad superior a la circundante
- Comparar con el CT

En algunos casos la correlación entre la imagen anatómica y la metabólica es coincidente y muy fácil...

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Anotar cualquier foco captante con actividad superior a la circundante
- Comparar con el CT

En otras localizaciones la correlación no es evidente y tenemos que señalar al radiólogo la lesión metabólica para que detecta si hay o no lesión anatómica

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Valorar cualitativamente: captación leve, moderada intensa
- Valorar cuantitativamente
 - SUVmax
 - Relación de actividad comparando con actividad vascular o con actividad hepática

Linfoma de Burkitt

- Captación intensa
- SUVmax 15,6

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Valorar cualitativamente: captación leve, moderada intensa
- Valorar cuantitativamente
 - SUVmax
 - Relación de actividad comparando con actividad vascular o con actividad hepática

Linfoma de Burkitt

- Captación leve
- Contralateral
- SUVmax 3,6

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Valorar cualitativamente: captación leve, moderada intensa
- Valorar cuantitativamente
 - SUVmax
 - Relación de actividad comparando con actividad vascular o con actividad hepática

Linfoma de Burkitt

- Captación intensa
- A distancia
- No esperada
- SUVmax 13,2

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Revisar tanto las imágenes con CA como sin CA

Lesiones profundas

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- En casos concretos, interpretar en el contexto de las guías internacionales:
 - Linfoma de Hogdkin y algunos linfomas NH: escala de 5 puntos Deauville
 - qPET – LH Euronet

[WB_CTAC] Pet Body
28/09/2020

[WB_CTAC] Pet Body
24/11/2020

LH – CUANTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A QT:

Deauville 5PS
reading criteria

Score 1: no uptake

Score 2: uptake $\leq$ mediastinum

Score 3: uptake $>$ mediastinum $\leq$ liver

Score 4: moderately increased uptake $>$ liver

Score 5: markedly increased uptake $>$ liver and/or new lesions related to lymphoma

Score X: new areas of uptake unlikely to be related to lymphoma

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- En casos concretos, interpretar en el contexto de las guías internacionales:
 - Linfoma de Hogdkin y algunos linfomas NH: escala de 5 puntos Deauville
 - qPET – LH Euronet

[WB_CTAC] Pet Body
28/09/2020

[WB_CTAC] Pet Body
24/11/2020

$$\text{qPET} := \frac{\text{peak residual uptake}}{\text{average uptake in liver}}$$

Tumor residuum:
4 hottest connected voxels

Liver: cuboid VOI of 30 ml

qPET	Deauville
0	1
< 0.95	2
0.95 - < 1.3	3
1.3 - < 2.0	4
≥ 2.0	5

Eur J Nucl Med Mol Imag 2014

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- En casos concretos, interpretar en el contexto de las guías internacionales:
 - Linfoma de Hogdkin y algunos linfomas NH: escala de 5 puntos Deauville
 - qPET – LH Euronet

[WB_CTAC] Pet Body
28/09/2020

[WB_CTAC] Pet Body
24/11/2020

CT: TC CORREC
PT: [WB_CTAC] Pet Body
CT: 28/09/2020
PT: 28/09/2020

Min: 0.6 SUV
Max: 5.4 SUV
Mean: 2.3 SUV
StdDev: 1.2 SUV

CT: TC CORREC
PT: [WB_CTAC] Pet Body
CT: 24/11/2020
PT: 24/11/2020

Min: 0.8 SUV
Max: 3.1 SUV
Mean: 1.6 SUV
StdDev: 0.6 SUV

qPET = 1,4

qPET	Deauville
0	1
< 0.95	2
0.95 - < 1.3	3
1.3 - < 2.0	4
≥ 2.0	5

Eur J Nucl Med Mol Imag 2014

INTERPRETACIÓN - FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

PROCESO DE INTERPRETACIÓN

- Detectar las captaciones atribuibles a variantes de normalidad
- Detectar las captaciones atribuibles a intervenciones recientes (cirugía, radioterapia)

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

Cuerdas vocales

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

LLANTO

- Musculatura intercostal
- Diafragma
- Pilares del diafragma

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

- Trasplante renal con componente obstructivo
- contaminación de la vía de inyección en tórax

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

- Foco pneumónico
- Infiltrado pulmonar

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

VACUNAS

PITFALLS MÁS FRECUENTES EN FDG-PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

CAPTACIÓN TÍMICA

CAPTACIÓN GRASA PARDA

CAPTACIÓN MUSCULAR

ANILLO DE WALDEYER

G-CSF FACTORES ESTIMULACION COLONIAS GRANULOCÍTICAS

CARTÍLAGOS DE CRECIMIENTO

CAPTACIONES NO DE CAUSA ONCOLÓGICA

INFECCIÓN FÚNGICA

- Diagnóstico de extensión
- Respuesta al tratamiento

1. Aspectos técnicos del PET-CT en Oncología Pediátrica
2. Principales indicaciones del PET-CT en Pediatría e interpretación de las imágenes
 - Imágenes variantes de normalidad
 - Casos clínicos con los tumores más frecuentes en Pediatría
3. Elaboración de informes de PET-CT en Pediatría

INFORME – PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

OBJETIVOS DEL INFORME

- Proporcionar al médico solicitante una respuesta oportuna o correcta a la pregunta clínica que ha hecho, dentro de los límites de la prueba realizada
- Documentar la idoneidad, necesidad y realización de la exploración
- Base para la correcta facturación del procedimiento diagnóstico

COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL CLÍNICO SOLICITANTE

- Comunicar adecuadamente los hallazgos que puedan tener una repercusión inmediata en el manejo del paciente
- Evitar discrepancias entre informe oral inicial y escrito final
- Comentar verbalmente las posibles discrepancias

INFORME – PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

INFORME ESCRITO:

- Identificación del paciente
- Tipo de estudio
- Fecha del estudio y hora si conveniente
- Accession number (software)
- Fecha del informe

Núm. MN:

20694883

F.NAC: **23/06/2010**

Apellidos y Nombre:

B C , M

Médico solicitante Dr/a:

Exploración:

PET-CT 18F-FDG ONCOLOGIA

Trazador:

Fluordesoxiglucosa 3mCi (111MBq) / DLP-332,84 mGy/cm

Fecha de exploración:

23/10/2020

INFORME – PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

INFORMACIÓN CLÍNICA

- Indicación del estudio
- Datos relevantes de la historia clínica

MOTIVO: NBL refractario incluida en ensayo clínico IDASA.

INFORME – PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

- Radiofármaco
- Dosis administrada
- Vía de administración
- Tiempo administración-imagen
- Fármacos: nombre, dosis, vía de administración
- Sedación o anestesia
- Protocolo PET: base cráneo a muslo, cuerpo entero
- Protocolo CT: baja dosis, diagnóstico, CT tórax
- Mencionar posibles artefactos: movimiento, orina

TÉCNICA:

Técnica: TC: cortes axiales desde cráneo hasta los pies sin contraste.

PET: Adquisición de imágenes una hora después de la administración de ^{18}F -FDG.
Glicemia 90 mg/dl.

INFORME – PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES:

1. Descripción de los hallazgos:
 - Localización
 - Extensión grado de intensidad: captación leve, moderada, intensa
 - SUVmax o bien comparación con la actividad de fondo vascular o hepática
 - Cuantificar: Deauville, otros
 - CT diagnóstico: incluir el informe o adjuntar el informe radiológico por separado
2. Comparación con estudios previos relevantes
3. Limitaciones: mencionar si existe alguna limitación a la interpretación de los resultados:
 - Factores de estimulación de colonias granulocíticas: limita la evaluación de la médula ósea
 - Artefacto por movimiento
 - Alteración en la biodistribución del radiofármaco

IMÁGENES PROCESADAS:

- Incluir imágenes procesadas o save-screen
- De los focos captantes y alteraciones de la captación mencionadas en la descripción
- Orientadas a la indicación de la exploración

INFORME – PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES

MOTIVO: Paciente de 5 años, con NBL.

TÉCNICA:

Se realiza estudio bajo sedación anestésica sin complicaciones.

CT: cortes axiales desde cráneo hasta los pies.

PET: Adquisición de imágenes una hora después de la administración de 18F-FDG.

Glicemia 58 mg/dl.

Se compara con el estudio realizado con 123I-MIBG

INFORME METABÓLICO:

En marco óseo, se observa una lesión ligeramente hipermetabólica en el 9º arco costal posterior derecho que presenta captación de MIBG más intensa. Asimismo se observan lesiones focales de leve hipermetabolismo en tercio medio de fémur izquierdo (SUVmax 1.3) y tercio proximal de tibia izquierda (SUVmax 1.2) que no captan MIBG.

No se ven otras lesiones óseas activas.

Destacamos áreas de captación nodular a nivel yeyuno/íleon de forma tubular asociado a intenso hipermetabolismo glucídico (SUVmax 7.2) en mesogastrio, que coincide por RM del 29.12.2020 con zona de edema yeyuno/ileal, a valorar proceso inflamatorio.

Parénquima pulmonar sin condensaciones ni lesiones nodulares sospechosas.

Correcto metabolismo hepático.

Bazo con leve aumento del metabolismo glucídico difuso de aspecto reactivo.

Excreción renal bilateral.

CONCLUSIÓN:

Estudio PET-CT que muestra una lesión ósea en 9º arco costal posterior derecho de bajo grado metabólica y moderadamente activa en MIBG.

Lesiones de bajo grado metabólico en tercio medio de fémur izquierdo y tercio proximal de tibia izquierda, no captantes de MIBG.

No visualizamos actividad metabólica en el resto de lesiones óseas captantes de MIBG.

Áreas de captación nodular a nivel yeyuno/íleon de forma tubular asociado a intenso hipermetabolismo glucídico en mesogastrio, que coincide por RM del 29.12.2020 con zona de edema yeyuno/ileal, a valorar proceso inflamatorio.

Sin otras alteraciones metabólicas significativas.

IMÁGENES PROCESADAS

INFORME – PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES

MOTIVO: Paciente de 5 años, con NBL.

TÉCNICA:

Se realiza estudio bajo sedación anestésica sin complicaciones.

CT: cortes axiales desde cráneo hasta los pies.

PET: Adquisición de imágenes una hora después de la administración de 18F-FDG.

Glicemia 58 mg/dl.

Se compara con el estudio realizado con 123I-MIBG

INFORME METABÓLICO:

En marco óseo, se observa una lesión ligeramente hipermetabólica en el 9º arco costal posterior derecho que presenta captación de MIBG más intensa. Asimismo se observan lesiones focales de leve hipermetabolismo en tercio medio de fémur izquierdo (SUVmax 1.3) y tercio proximal de tibia izquierda (SUVmax 1.2) que no captan MIBG.

No se ven otras lesiones óseas activas.

Destacamos áreas de captación nodular a nivel yeyuno/íleon de forma tubular asociado a intenso hipermetabolismo glucídico (SUVmax 7.2) en mesogastrio, que coincide por RM del 29.12.2020 con zona de edema yeyuno/ileal, a valorar proceso inflamatorio.

Parénquima pulmonar sin condensaciones ni lesiones nodulares sospechosas.

Correcto metabolismo hepático.

Bazo con leve aumento del metabolismo glucídico difuso de aspecto reactivo.

Excreción renal bilateral.

CONCLUSIÓN:

Estudio PET-CT que muestra una lesión ósea en 9º arco costal posterior derecho de bajo grado metabólica y moderadamente activa en MIBG.

Lesiones de bajo grado metabólico en tercio medio de fémur izquierdo y tercio proximal de tibia izquierda, no captantes de MIBG.

No visualizamos actividad metabólica en el resto de lesiones óseas captantes de MIBG.

Áreas de captación nodular a nivel yeyuno/íleon de forma tubular asociado a intenso hipermetabolismo glucídico en mesogastrio, que coincide por RM del 29.12.2020 con zona de edema yeyuno/ileal, a valorar proceso inflamatorio.

Sin otras alteraciones metabólicas significativas.

IMÁGENES PROCESADAS

INFORME – PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES

MOTIVO: Paciente de 5 años, con NBL.

TÉCNICA:

Se realiza estudio bajo sedación anestésica sin complicaciones.

CT: cortes axiales desde cráneo hasta los pies.

PET: Adquisición de imágenes una hora después de la administración de 18F-FDG.

Glicemia 58 mg/dl.

Se compara con el estudio realizado con 123I-MIBG

INFORME METABÓLICO:

En marco óseo, se observa una lesión ligeramente hipermetabólica en el 9º arco costal posterior derecho que presenta captación de MIBG más intensa. Asimismo se observan lesiones focales de leve hipermetabolismo en tercio medio de fémur izquierdo (SUVmax 1.3) y tercio proximal de tibia izquierda (SUVmax 1.2) que no captan MIBG.

No se ven otras lesiones óseas activas.

Destacamos áreas de captación nodular a nivel yeyuno/íleon de forma tubular asociado a intenso hipermetabolismo glucídico (SUVmax 7.2) en mesogastrio, que coincide por RM del 29.12.2020 con zona de edema yeyuno/ileal, a valorar proceso inflamatorio.

Parénquima pulmonar sin condensaciones ni lesiones nodulares sospechosas.

Correcto metabolismo hepático.

Bazo con leve aumento del metabolismo glucídico difuso de aspecto reactivo.

Excreción renal bilateral.

CONCLUSIÓN:

Estudio PET-CT que muestra una lesión ósea en 9º arco costal posterior derecho de bajo grado metabólica y moderadamente activa en MIBG.

Lesiones de bajo grado metabólico en tercio medio de fémur izquierdo y tercio proximal de tibia izquierda, no captantes de MIBG.

No visualizamos actividad metabólica en el resto de lesiones óseas captantes de MIBG.

Áreas de captación nodular a nivel yeyuno/íleon de forma tubular asociado a intenso hipermetabolismo glucídico en mesogastrio, que coincide por RM del 29.12.2020 con zona de edema yeyuno/ileal, a valorar proceso inflamatorio.

Sin otras alteraciones metabólicas significativas.

IMÁGENES PROCESADAS

INFORME – PET EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

- Se debe incluir una impresión diagnóstica como resumen de la interpretación del estudio
- Debe tener en cuenta
 - La indicación clínica
 - El diagnóstico diferencial
- Debe valorar los hallazgos en el contexto de la orientación diagnóstica o de la pregunta clínica

MOTIVO: Paciente de 12 años con Linfoma de Hodgkin. Evaluación post-2do OEPA.

Estudio PET-TC que muestra signos de respuesta morfometabólica casi completa al tratamiento, con persistencia de un foco de moderado hipermetabolismo residual en la celda tímica, en la misma localización de una de las lesiones iniciales con mayor metabolismo, compatible con respuesta morfometabólica parcial a la terapia (DS 3 por persistencia de masa en mediastino anterior, con qPET 1,40). Recomendamos valorar de forma dirigida. Persistencia de condensación y opacidad normometabólica en LSI. Lesión hipodensa normometabólica supraclavicular izquierda en región de biopsia, de aprox 31mm, a valorar seroma. Sin otras alteraciones.